



ಅಧಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಂಘ (B.P.N.I.- Breastfeeding Promotion Network of India)

ಬಿ.ಪಿ.ಎನ್.ಐ. - ಕನಾರ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ.

ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ

ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದೇಹಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ

ಮುನ್ಮುಕ್ತಿ :

ಮಗುವಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬವರೆಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ನೀಡುವುದರೆ ಅಹಾರವಾಗಿಯತ್ತದೆ. ಮೇರಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವ ಅವಕ್ಷೇತನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಜೋಡಿಗೆ ವರ್ದಿಕಾಲನ್ನು ಎರಡು ವರ್ವೆದವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಿಸಬೇಕು. ಎದೆ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಬೀರಾಗುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾಯಿ ವಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ನಡುವೆ ಬಾಂಧ್ಯ, ಶ್ರೇಣಿ, ಮವತೆಯನ್ನು ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀಡುವುದರಿಂದ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾಗಿ (ಬರಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ) ಖಾದಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಗಭರ್ಡಾರನೆ ಮುಂದಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನಸದ ನಡುವೆ ಅಂತರಿಸಿದುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಿನತೆ (ಅನಿಮಿಂ) ಆಗುವುದು ಕಿಡಿವೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತನದ ಕ್ವಾನ್ಸ್‌ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಪ್ರಥಮ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು :

ಮಗುವು ಒನ್ನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲತ್ತದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಭಾವದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರಿಸಿ, ಬೆಂಬ್ರೆಗೆ ಇಡಬೇಕು. ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹೊಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ತಾಯಿಯ ತನ್ನ ವಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎದೆಹಾಲು ಕೊಡಲು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ವ್ಯಾನ ವಾಡಿಸಲು ಅವರ ಪಡಬಾರದು.

ಕಿಂತ್ರಾವಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಗೆ ಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟಿದ 30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬಹಳ ನೀಟ್ಯಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾದೆ ಬೇವುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- ಬರಿ ತಾಯಿಯ ಹಾಲೊಂದೇ ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮದ್ದೆ ಬಾಂಧ್ಯ ಮಧುರವಾಗಿ ಬೀಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮದ್ದೆ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಗುವಿನ ಜನಸದ ನಂತರದ ಗಭರ್ಡೋಕ್ಸದ ರಕ್ತನ್ಯಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಎದೆಹಾಲು ಹೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಬಯವ ಹಳದಿ ಬಳ್ಳಿದ ಗೀಳು ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ದೋರಿಕಂಡಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾಲು ಮಗುವಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ತಕ್ಷಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ದೋರಿಯುವ ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಇಮ್ಮೂನಿಟಿಫೆನ್).

2. ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬರಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಖಾದಿಸಬೇಕು

ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ದಿಂಡ್ಯು ಇನ್ನನ್ನೂ ಖಾದಿಸಬಾರದು. ಅಂದರೆ ಮಡಿಲಿನ ಹಾಲು, ದಿಂಡಿ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು, ಡೇನು ಮತ್ತು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಖಾದಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟ್‌ರೂ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಡೈಟರಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷಮಿನ್ ಕಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ವಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೇರಿಸಿದೇ ಹಾಕಬೇಕು.

- ಮಗುವಿಗೆ ಆಯ ತಿಂಗಳು ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಬರೇ ಎಡೆ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ತಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
- ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎದೆಹಾಲೆನ ಜೊತೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎಡೆ ಚೀಪುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಂಜಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.
- ಬೇರೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಎದೆಹಾಲೆನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆಯ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬರೇ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ತಾಯಿ ಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಬುದ್ದಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಅಂತರವನ್ನು ಇಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸ್ವಸ್ಥಪಾನದಿಂದ ಸ್ವನ್ ಹಾಗೂ ಗಭರ್‌ಹೋತಗಳ ಕ್ಷಾಸ್‌ರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಹೀನತೆ ಹೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಎದೆಹಾಲಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ವನನ್ನೂ ಕುಡಿಸಬಾರದು ಹಾಗೂ ಚೀಪುವುದಕ್ಕೂ ರಬ್ಬರ್ ನಿಪ್ಪ್ಲ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು.

- ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಕಣ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರು, ಹಸುವಿನ ಹಾಲು, ಜೀನು ತುಪ್ಪ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ತಪ್ಪು ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಲ್ಲದೇ ತಾಯಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚೀಪುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು (ರಬ್ಬರ್ ನಿಪ್ಪ್ಲ್) ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಬ್ಬರ್ ನಿಪ್ಪ್ಲ್‌ಗೂ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಎಡೆ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ರಬ್ಬರ್ ನಿಪ್ಪ್ಲ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮಗುವು ತಾಯಿಯ ಎದೆಯನ್ನು ಚೇಪಲು ಸಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಎಡೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯವ ವಿಧಾನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಾಯಿಯು ತೆಳಿದು ತೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ :
ಬಾಟಲಿ ಹಾಲು ಪಾರಂಭಿಸುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ. ಅದು ತಾಯಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ವಿಧಾನ :

ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹುಳಿತು ಅಥವಾ ಮಲಗಿ ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ದೇಹವನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಷ್ಟು ಮಮತೆಯಿಂದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ಮಗು ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯವ ರೀತಿ :

ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲು ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿದೆಯೇ ಎಂದು ಸೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ (ಬರೇ ಸ್ವನ್ದದ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ) ಎಷ್ಟ ಚೀಪಿದರೂ ಹಾಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ದರಿಂದ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಬಡೆಯತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಎದೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಚ್ಚಿದೆಯೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗೇಬೇಕಾದರೆ ಮಗುವಿನ ಗದ್ದು ಎದೆಗೆ ತಾಕಿರಬೇಕು. ಬಾಯಿ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಮಗುವಿನ ಕೆಳತುಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಡಿಚಿರಬೇಕು. ಎದೆಯ ಕರಿಯ ಭಾಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ಎಡೆ ತೊಟ್ಟಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋವಾಗಬಾರದು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಎಡೆ ತೊಟ್ಟು ಬಡೆಯವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಪ್ಪು ಹಾಲು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

(ಮುಂದಿನ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ)

ತಾಯಿ - ಮಗು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ

BODY POSITION



ಮಗುವನ್ನು ಎಡಿಗೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ


1. ತಾಯಿಯ ಗಮನ ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ.
2. ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿದೆ.
3. ಮಗುವಿನ ದೇಹ ತಾಯಿಯ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ.
4. ಮಗುವಿನ ದೇಹ ತಾಯಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿದೆ. ಮುಖವು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದೆ.
5. ಮಗುವಿನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ತಾಯಿ ಏರಿಸು ಕ್ರೇಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗೆ.
6. ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಇದೆ.

ಮಗುವನ್ನು ತಪ್ಪಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಗೆ ಹಾಕಿರುವುದು.

1. ತಾಯಿಯ ಗಮನ ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ.
2. ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ.
3. ಮಗುವಿನ ದೇಹ ತಾಯಿಯ ದೇಹದ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಗಿಲ್ಲ.
4. ಮಗುವಿನ ದೇಹ ತಾಯಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
5. ಮಗುವಿನ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ತಾಯಿ ಕ್ರೇಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ.
6. ತಾಯಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮಗುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲ.

ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಳಿಸುವ ವಿಧಾನ

SUCKING POSITION



**ಮಗುವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಡ ಕಚ್ಚುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು**

1. ಮಗುವಿನ ಗದ್ದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ.
2. ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆಗೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳತುಟಿಯು ಹೀಂದರ್ಕೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
3. ಎಡಯ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
4. ಮಗು ಎಡ ಚೀಪುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ನೋನ್ಯಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

**ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಎಡ ಕಚ್ಚುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು**

1. ಮಗುವಿನ ಗದ್ದು ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಡಯ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಚೀಪುತ್ತಿದೆ.
2. ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿಲ್ಲ.
3. ಎಡಯ ಕಪ್ಪು ಭಾಗ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ.
4. ಮಗು ಎಡ ಚೀಪುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾಯಿಗೆ ನೋವ್ಯಂತಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದು:

ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎದೆಯಂದಲೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಬೇಕು. (8-10 ಸಲ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲ) ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ಒಂದುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಉಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಆವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

6. ಮೇಲಿನ ಆಹಾರ :-

ಮೇಲಿನ ಆಹಾರ ಎಂದರೆ ಗಂಜಿರೂಪದ ಅಥವಾ ಅರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಚೊಂಡಿಗೆ ಕೊಡುವುದು.

ಸರಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ಆಹಾರ ಯಾವುದು? ಅಥವಾ ಎಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು?

ಈ ಆಹಾರವು ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಮಗುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಾಂಗಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಿಸಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇಣಿವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು?

6 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ತೆಳ್ಳನೆಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲದಂತೆ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಬೆರಳಿಸಿದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತೆಳ್ಳನೆಯ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸವಾದ ಮೇಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 3 ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಗಂಜಿಯನ್ನು ಮೂರು ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಜಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಹುದು.

9 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ :

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು (Semi Solid) 3 ರಿಂದ 5 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಮೇಲಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅಲಬ್‌, ಅಸ್ಟ್‌, ಭೇದಿ ಖಾಯಲೀಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೆ (1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷ)

ಕಾಳು, ಬೀಳಿ, ತರಕಾರಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತೆಳಿ ರಸ, ಕಿಚಡಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನ ಚೊಂಡಿ ಬೆರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳು, ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೀನು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನ್ನಾಂಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯಿದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಗು ಇಷ್ಟ ವಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.

7. ಸಮಂಜಸವಾದ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಗಂಜಿರೂಪದ ಆಹಾರಗಳು:

ಮಗುವಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೂಡುವಾಗ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಮಗುವು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಗುವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಕಲಿಯತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹೋಸ ಹೋಸ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

8. ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು:

ಎರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಮಂಬಿದ ಮೇಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ

- ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತದೆ.
- ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ನಂಜಿನ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತದೆ.

9. ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: (ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಾತೆಯರಿಗಾಗಿ - For Working Women)

ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಿಂದಿರು ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯೆಯಿಂದ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ಟ್ರೋಲಿನ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಈ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಾಲನ್ನು 8 ತಾಸು ಕೋಣೆಯ ಉಪ್ಪಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು (ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ). 24 ತಾಸುಗಳವರಿಗೆ ರೆಫ್ಲಿಜರೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯವಿರಬೇಕು.

ಮಗು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕ್ಯೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಿರಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಸಲು ತೆಳಿಸಬೇಕು. ಮಗು ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾಗಿ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ವೇళೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ರಚೆ ಮುಗಿದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯ ಹೋಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿ ಬರಬೇಕು. ಬಂದು ವೇళೆ ಮೇಲೆನ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲ. ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಧರ್ಮಾಸ್ತಾ ಪಾಲಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮಾರನೆಯ ದಿವಸ ಕಾಯಿಸಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಹಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಚೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎದೆ ಬಾಪು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

(ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಟಿಕಾರ್ಲೀ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ)

10. ತಾಯಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಮಗು ಖಾಯಿಲೆ ಆದಾಗ :

ಸಾವಾನ್ಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಎದೆಹಾಲು ಉಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮಗುವಿಗೆ ವಾಂತಿ ಚೆಂಡಿಯಾದಾಗ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕೂಡುವುದು ಉಪಯೋಗಕರ. ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹೋರಣ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ದಿನ ತುಂಬದೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ಕುಡಿದ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕ್ಯೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಚಮಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಾ ಒಳಿಯಿಂದ ಕುಡಿಸಬೇಕು. (ಮಗುವು ಎದೆಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ)

ಹರಿಗಿಯಾದ ನಂತರ ತಾಯಿಯ ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಮಗುವಿನ ಆರ್ಯೇಕೆ ಮಾಡುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ನೆನೆಸಿರಲೆ : ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ಆರು ಅಂಗಕವರಿಗೆ ಬರಿ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಸಬೇಕು.

ಆರು ಅಂಗಕ ನಂತರ ಮೇಲನ್ನು ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು.

These guidelines take into consideration, the recommendations of World Health Organization (WHO), and of World Health Assembly (WHA) Resolution 54.2 (May 18, 2001), and the support to this recommendation by the Department of Women and Child Development (DWCD) and Ministry of Health & Family Welfare (MOHFW), Association for Consumer Action on Safety and Health (Acash), Indian Academy of Pediatrics (IAP), Federation of Obstetrics & Gynaecological Societies of India (FOGSI), National Neonatology Forum (NNF), Trained Nurses Association of India (TNAI), CARE-India, Linkages International Body Food Action Network (IBFAN), World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), and American Academy of Pediatrics.

This document has been produced as an activity of the BPNI-IBFN South Asia's Resource Centre on Infant & Young Child Feeding under the IBFAN-GIFA Project WW 033 207, 2000-2002 'Strengthening breastfeeding activities at grassroot level' with the support from Dutch Ministry of Cooperation and Development (DGIS).

 BPNI	For more information, please contact : Breastfeeding Promotion Network of India (BPNI)/IBFN South Asia BP-33, Pitampura, Delhi 110 088 (INDIA) Tel : +91-17-7443445 Tel / Fax : +91-17-7219606 E-mail : bpni@bpni.org Website : http://www.bpin.org	ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಡಾ॥ ನಿಮ್ಮಲ ಕೇಸರಿ ನಿದೇಶಕರು ಡಾ॥ ಸಿ.ಆರ್. ಬಾಬುಪುರಮುರ್ತಿ ರಾಜ್ಯಸಂಖಾಲಕರು ಬಾಪೂಡಿ ಮತ್ತು ಅರೋಗ್ಯ ಸಂಸೈ ದಾವಣಗೆರೆ - 577 004. ದೂರವಾಣಿ : 08192 - 50350, ಫೋನ್ : 08192 - 53859 E-mail : beabchi@satym.net.in
--	---	---

ಅವಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಹಿಸುವ ಸಂಘ
(B.P.N.I.- Breastfeeding Promotion Network of India)

ಬಿ.ಪಿ.ಎನ್.ಐ. - ಕನಾಂಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ

Book-Post

ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಹಾಗೂ
ಅಂತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 10 ಸಂದರ್ಭಗಳ ಮಾರ್ಗಾವಳಿ

To,

If not delivered, please return to :

DR. C.R. BANAPURMATH

State Convenor - BPNI

Bapuji Child Health Institute & Research Centre
DAVANGERE - 577004, Karnataka State.

Ph : 08192-50350 Fax : 08192 - 53859

E-mail : beabchi@satym.net.in